

1. FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN**Sustainable Agro Solutions S.A.U.**

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

ESPAÑA

Fabricado en España

**2. RIQUEZAS GARANTIZADAS**

Riquezas garantizadas	g/L
Aminoácidos libres	55,9
Nitrógeno (N) total	35,0
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	113,1
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	45,1

3. NOMBRE COMERCIAL**codamin radicular**

ABONO CON AMINOÁCIDOS NPK

4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	Solución
Estado físico	Líquido
Color	Granate
Olor	Típico del producto
Densidad (g/ml)	1,16 ± 0,01
pH	5,59 ± 1,00
Solubilidad	Totalmente soluble en agua

**Copia no controlada*

5. PROPIEDADES

codamin radicular es un bioestimulante a base de un equilibrio de aminoácidos específicos de origen vegetal con fósforo y potasio.

codamin radicular posee una doble acción: enraizante y nutricional. Promueve la formación de un sistema radicular sano, amplio y con mayor volumen de pelos absorbentes y de mayor efectividad.

En situaciones de estrés (trasplante, heladas, toxicidad, etc.) nutre y da energía extra a la planta, contribuyendo a su rápida recuperación y su consecuente activación vegetativa.

6. MODO DE APLICACIÓN Y DOSIS

codamin radicular es un producto totalmente soluble en el agua, recomendado para su aplicación mediante fertirriego para todo tipo de cultivos. Las dosis medias recomendadas son:

Tipo de aplicación		Dosis de aplicación
Fertirriego		5 – 10 l/ha – aplicación 20 – 40 l/ha por ciclo de cultivo
Cultivo	Tipo de aplicación	Dosis de aplicación
Frutales	Fertirriego	20 – 40 l/ha por ciclo Fraccionado desde el inicio de la brotación y durante el desarrollo del fruto
Hortícolas	Fertirriego	Aire libre: 4 – 8 l/ha y aplicación en las primeras etapas del cultivo Invernadero: 5 – 10 l/ha – aplicación, una vez por semana
Ornamentales	Fertirriego	2 – 3 l/ha cada 15 días Fraccionado desde el inicio de la plantación

En fresón se recomienda una dosis media de 0,5 - 1 litro cada 10 millares de plantas, desde enraizamiento cada 7-10 días.

7. OBSERVACIONES

codamin radicular no está sujeto a ninguna consideración toxicológica, tanto de transporte como de almacenamiento.

codamin radicular es compatible con la mayoría de productos fertilizantes, aunque se recomienda una prueba previa de compatibilidad.

Almacenar el producto en lugar fresco y seco.

Temperatura óptima de almacenamiento entre 5 y 30°C.

No apilar más de cinco cajas de altura o tres envases de 20 litros.

Se recomienda su aplicación bajo asesoramiento técnico agronómico

Utilícese en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis indicadas.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

**Copia no controlada*